



ИНСТРУКЦИЯ



ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА “Optixx” (Оптикс)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: Р № 1234567890 от 00.00.2009 г. до 00.00.2014 г
Биологически активная добавка (БАД). Не является лекарством.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

СОСТАВ

Активные ингредиенты	Содержание (только активные компоненты)		
	в 1 капсуле	в 2 капсулах	в 3 капсулах
Витамины			
Витамин А	500 МЕ	1000 МЕ	1500 МЕ
Витамин D3	67 МЕ	133 МЕ	200 МЕ
Витамин E	5 МЕ (мг)	10 МЕ (мг)	15 МЕ (мг)
Витамин В1	0,67 мг	1,33 мг	2 мг
Витамин В2	0,6 мг	1,2 мг	1,8 мг
Витамин В6	0,67 мг	1,33 мг	2 мг
Витамин В12	1 мкг	2 мкг	3 мкг
Ниацин	6 мг	12 мг	18 мг
Фолиевая кислота	67 мкг	133 мкг	200 мкг
Пантотеновая кислота	2 мг	4 мг	6 мг
Биотин	3,33 мкг	6,66 мкг	10 мкг
Витамин С	30 мг	60 мг	90 мг
Микроэлементы			
Цинк	5 мг	10 мг	15 мг
Селен	8,33 мг	16,66 мг	25 мг
Каротиноиды			
Бета-каротин	0,67 мг	1,33 мг	2 мг
Лютеин	1 мг	2 мг	3 мг
Зеаксантин	0,2 мг	0,4 мг	0,6 мг
Флавоноиды			
Экстракт черники	3,33 мг	6,66 мг	10 мг

ВОСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, сахар, кальция карбонат, желатин (капсулы).

ДЕЙСТВИЕ

Действие препарата обусловлено входящими в его состав комплексом витаминов, микроэлементов, каротиноидов и антоцианов, играющих важную роль в поддержании здоровья глаз.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- для профилактики дефицита витаминов и микроэлементов.
- для улучшения функционального состояния зрения, в качестве профилактического и общеукрепляющего средства при:
- синдроме зрительной усталости (при длительной работе на компьютере, чтении, просмотре телевизора и т.п.)
- ухудшении работы органов зрения
- ношении контактных линз
- комплексной терапии заболеваний глаз
- возрастных изменениях структуры глаз
- восстановлении после глазных операций и травм

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 12 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутри во время или сразу после еды – по 3 капсулы 1 раз в день (или по 1 капсуле 3 раза в день).
Продолжительность курса приема – 1-3 месяца.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Рекомендуемые дозы обычно хорошо переносятся. В редких случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Во избежание передозировки не рекомендуется принимать одновременно с другими поливитаминными комплексами. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет из-за наличия рибофлавина (безвредно).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

При применении в рекомендуемых дозах не отмечены.

ФОРМА ВЫПУСКА

По 20 капсул в блистерной упаковке. 5 блистерные упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В местах недоступных для детей при температуре до 25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта