

ИНСТРУКЦИЯ



ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

“Vitamixx”

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: Р № 1234567890 от 00.00.2009 г. до 00.00.2014 г.
Биологически активная добавка (БАД). Не является лекарством.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

СОСТАВ

Активные ингредиенты	Содержание (только активные компоненты)		
	в 1 капсуле	в 2 капсулах	в 3 капсулах
Витамин А (ацетат и бета-каротин)	1300 МЕ	2600 МЕ	3900 МЕ
Витамин D3	100 МЕ	200 МЕ	300 МЕ
Витамин Е	7,5 мг	15 мг	22,5 мг
Витамин В1	1 мг	2 мг	3 мг
Витамин В2	0,9 мг	1,8 мг	2,7 мг
Витамин В6	1,5 мг	3 мг	4,5 мг
Витамин В12	1,5 мкг	3 мкг	4,5 мкг
Ниацин	9 мг	18 мг	27 мг
Фолиевая кислота	100 мкг	200 мкг	300 мкг
Пантотеновая кислота	3 мг	6 мг	9 мг
Биотин	15 мкг	30 мкг	45 мкг
Витамин С	30 мг	60 мг	90 мг
Йод	70 мкг	140 мкг	210 мкг
Цинк	6 мг	12 мг	18 мг
Селен	10 мкг	20 мкг	30 мкг

ВОСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, сахар, кальция карбонат, желатин (капсулы).

ДЕЙСТВИЕ

Комплекс разработан для восполнения физиологической потребности в витаминах, йоде, цинке и сбалансирован с учетом суточной потребности. Действие препарата определяется свойствами входящих в его состав компонентов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- профилактика гипо- и авитаминозов, дефицита микроэлементов йода и цинка у взрослых и детей с 12 лет;
- несбалансированное и неполноценное питание, соблюдение диет;
- повышенные физические и умственные нагрузки, стресс; состояния, которые сопровождаются повышенной потребностью в витаминах (период роста, заболевания, период реконвалесценции),
- курение, злоупотребление алкоголем, нарушения всасывания (при желудочно-кишечных заболеваниях, диарее), проживание
- в экологически неблагоприятных районах и др.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 12 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутри во время или сразу после еды, взрослым и детям с 12 лет.

для профилактики гипо- и авитаминозов — по 1 капсуле 2 раза в день, или 2 капсулы 1 раз в день. при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах — по 1 капсуле 3 раза в день, или 3 капсулы 1 раз в день.

для коррекции витаминов с профилактической целью в летний период — по 1 капсуле 1 раз в день.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Рекомендуемые дозы обычно хорошо переносятся. В редких случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Во избежание передозировки не рекомендуется принимать одновременно с другими поливитаминными комплексами и препаратами, содержащими йод. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет из-за наличия рибофлавина (безвредно).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

При применении в рекомендуемых дозах не отмечены.

ФОРМА ВЫПУСКА

По 20 капсул в блистерной упаковке. 1, 2, 3, 4, 5 блистерные упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В местах недоступных для детей при температуре до 25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.