

ИНСТРУКЦИЯ



ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

“Vitamixx School” (Витамикс Скул)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: Р № 1234567890 от 00.00.2009 г. до 00.00.2014 г
Биологически активная добавка (БАД). Не является лекарством.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

СОСТАВ

Активные ингредиенты	Содержание (только активные компоненты)	
	в 1 капсуле	в 2 капсулах
Витамин А	1166 МЕ	2333 МЕ
Витамин D3	125 МЕ	250 МЕ
Витамин Е	6 МЕ (6 мг)	12 МЕ (12 мг)
Витамин В1	0,55 мг	1,1 мг
Витамин В2	0,6 мг	1,2 мг
Витамин В6	1 мг	2 мг
Витамин В12	1 мкг	2 мкг
Ниацин	6,5 мг	13 мг
Фолиевая кислота	100 мкг	200 мкг
Пантотеновая кислота	2 мг	4 мг
Биотин	10 мкг	20 мкг
Витамин С	30 мг	60 мг
Йод	50 мкг	100 мкг
Цинк	4,5 мг	9 мг
Селен	7,5 мкг	15 мкг

ВОСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, сахар, кальция карбонат, желатин (капсулы).

ДЕЙСТВИЕ

Комплекс разработан для восполнения физиологической потребности в витаминах, йоде, цинке и сбалансирован с учетом суточной потребности. Действие препарата определяется свойствами входящих в его состав витаминов и микроэлементов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Детский возраст от 7 до 12 лет:

- для профилактики гипо- и авитаминозов, недостатка йода в организме в период роста и развития;
- при повышенных физических и умственных нагрузках, регулярных занятиях спортом;
- при несбалансированном и неполноценном питании;
- для повышения сопротивляемости организма в период заболеваний и выздоровления.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 7 лет.

Пища, которую мы едим каждый день, не обеспечивает наш организм витаминами в необходимом количестве. Поэтому специалисты НИИ питания РАМН считают целесообразным принимать витаминно-минеральные комплексы на протяжении всего года, вне зависимости от сезона*.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутри во время или после еды.
для профилактики гипо- и авитаминозов – по 1 капсуле 2 раза в день, или 2 капсулы 1 раз в день.
для коррекции витаминов с профилактической целью в летний период – по 1 капсуле 1 раз в день.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Рекомендуемые дозы обычно хорошо переносятся. В редких случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

СОБЫТИЯ УКАЗАНИЯ

Во избежание передозировки не рекомендуется принимать одновременно с другими поливитаминными комплексами и препаратами, содержащими йод. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет из-за наличия рибофлавина (безвредно).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

При применении в рекомендуемых дозах не отмечены.

ФОРМА ВЫПУСКА

По 20 капсул в блистерной упаковке. 1, 2, 3, 4, 5 блистерные упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В местах недоступных для детей при температуре до 25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.